



Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Istituto per la salute sanitaria di Capodistria



Vsak je svojega zdravja kovač

Vojkovo nabrušje 4/a
6000 Koper / Capodistria

tel. +386 3 66 39 890, fax +386 3 66 39 898
e-pošta: info@zdravstvo-kp.si, www.zdravstvo-kp.si

Oddelek za socialno medicino

ANALIZA UMRLJIVOSTI V ZDRAVSTVENI REGIJI KOPER V LETU 2007

Pripravile:

Marina SUČIĆ VUKOVIĆ, dr. med., spec. soc. med.
Bojana BAŽEC, univ. dipl. inž. kem. inž.
Irena MAJCAN KOPILOVIĆ, dipl. san. inž.

Koper, december 2008

VSEBINA

	Stran
1 OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI REGIJE KOPER za leto 2007.....	3
1.1 ŠTEVILO PREBIVALCEV	3
1.2 BIOLOŠKA IN STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALCEV	3
2 UMRLJIVOST V REGIJI KOPER v letu 2007	3
2.1 ŠTEVILO UMRLIH PREBIVALCEV IN STAROST	3
2.1.1 Število umrlih prebivalcev in starost po spolu	3
2.1.2 Število umrlih prebivalcev in starost po upravnih enotah regije Koper.....	3
2.2 VZROKI SMRTI	3
2.2.1 Število umrlih prebivalcev regije Koper po vzrokih smrti	3
2.2.2 Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) po vzrokih smrti.....	3
2.2.2.1 SDR za nekatere specifične vzroke smrti	3
Smrti zaradi zunanjih vzrokov	3
Ishemične bolezni srca	3
Cerebrovaskularne bolezni	3
Pljučni rak.....	3
Rak dojke	3
Rak materničnega vratu	3
Rak ustne votline in žrela	3
Sladkorna bolezen	3
Kronične bolezni jeter in ciroza	3
2.2.3 Vzroki umrljivosti po starostnih skupinah.....	3
3 PREZGODNJA UMRLJIVOST V REGIJI KOPER v letu 2007	3
3.1 ŠTEVILO PREZGODNJIH SMRTI	3
3.1.1 Število prezgodnjih smrti po spolu	3
3.2 VZROKI PREZGODNJE UMRLJIVOSTI.....	3
3.2.1 Število prezgodnjih smrti po vzrokih	3
3.2.2 Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL.....	3

1 OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI REGIJE KOPER za leto 2007

1.1 ŠTEVILO PREBIVALCEV

Zdravstvena regija Koper (regija Koper) obsega naslednje občine: Ilirska Bistrica (Upravna enota Ilirska Bistrica), Izola (Upravna enota Izola), Koper (Upravna enota Koper), Piran (Upravna enota Piran), Pivka in Postojna (Upravna enota Postojna), Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (Upravna enota Sežana). Na dan 30. 6. 2007 je imela 142.322 prebivalcev.

Preglednica 1. Število prebivalcev po spolu, regija Koper po upravnih enotah in Slovenija, 2007

	MOŠKI	ŽENSKÉ	SKUPAJ
IL. BISTRICA	6.996	7.154	14.150
IZOLA	7.795	7.729	15.524
KOPER	24.792	25.353	50.145
PIRAN	8.482	8.893	17.375
POSTOJNA	10.568	10.542	21.110
SEŽANA	12.229	11.789	24.018
REGIJA KOPER	70.862	71.460	142.322
SLOVENIJA	995.125	1.024.281	2.019.406

Vir podatkov: *Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*

1.2 BIOLOŠKA IN STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALCEV

V letu 2007 je bilo v regiji Koper 70.862 (49,8 %) moških in 71.460 (50,2%) žensk. Podobno razmerje med spoloma je bilo tudi v Sloveniji (49,3 % moških in 50,7 % žensk).

V regiji Koper in v Sloveniji je bil v letu 2007 največji delež prebivalcev v starostni skupini 50 - 54 let.

Delež otrok in mladostnikov do 14. leta starosti je bil v regiji Koper nižji od slovenskega povprečja in je znašal 12,2 %, delež starostnikov nad 65. letom, ki je že vrsto let višji od slovenskega povprečja, pa je znašal 17,1 %.

Preglednica 2 a. Število prebivalcev po spolu in starostnih skupinah, regija Koper, 2007

Starostna skupina	MOŠKI	ŽENSKE	SKUPAJ
manj kot 1 leto	662	614	1.276
1 do 4 let	2.328	2.252	4.580
5 do 9 let	2.877	2.692	5.569
10 do 14 let	3.042	2.870	5.912
15 do 19 let	3.809	3.556	7.365
20 do 24 let	4.845	4.362	9.207
25 do 29 let	5.868	5.299	11.167
30 do 34 let	5.870	5.141	11.011
35 do 39 let	5.262	4.655	9.917
40 do 44 let	5.592	5.202	10.794
45 do 49 let	5.761	5.511	11.272
50 do 54 let	6.434	5.840	12.274
55 do 59 let	5.646	5.278	10.924
60 do 64 let	3.248	3.454	6.702
65 do 69 let	3.371	3.988	7.359
70 do 74 let	2.660	3.560	6.220
75 do 79 let	1.919	3.310	5.229
80 do 84 let	1.139	2.431	3.570
85 let in več	529	1.445	1.974
SKUPAJ	70.862	71.460	142.322


Vir podatkov: *Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*

Preglednica 2 b. Število prebivalcev po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2007

Starostna skupina	MOŠKI	ŽENSKE	SKUPAJ
manj kot 1 leto	10.043	9.552	19.595
1 do 4 let	37.208	35.271	72.479
5 do 9 let	46.806	43.852	90.658
10 do 14 let	50.493	47.827	98.320
15 do 19 let	60.324	56.582	116.906
20 do 24 let	70.525	65.133	135.658
25 do 29 let	80.515	73.475	153.990
30 do 34 let	79.094	72.786	151.880
35 do 39 let	75.053	70.663	145.716
40 do 44 let	80.259	77.315	157.574
45 do 49 let	78.825	75.582	154.407
50 do 54 let	81.760	76.877	158.637
55 do 59 let	69.941	68.131	138.072
60 do 64 let	49.044	52.908	101.952
65 do 69 let	44.974	52.673	97.647
70 do 74 let	36.020	49.828	85.848
75 do 79 let	25.789	44.227	70.016
80 do 84 let	12.585	32.043	44.628
85 let in več	5.867	19.556	25.423
SKUPAJ	995.125	1.024.281	2.019.406


Vir podatkov: *Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*

Slika 1. Delež (%) prebivalcev po spolu in starostnih skupinah, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Slika 2. Delež (%) otrok 0 - 14 let in delež (%) starih 65 let in več, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

2 UMRLJIVOST V REGIJI KOPER v letu 2007

2.1 ŠTEVILO UMRLIH PREBIVALCEV IN STAROST

2.1.1 Število umrlih prebivalcev in starost po spolu

Podatki o umrlih se nanašajo na osebe s stalnim prebivališčem v R Sloveniji, ki so umrle v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007, iz Zbirke podatkov o umrlih Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ RS).

V regiji Koper je v letu 2007 umrlo 1.376 prebivalcev, od tega 723 (52,5 %) moških in 653 (47,5 %) žensk. Polovica umrlih moških je bila mlajših od 74,7 let (mediana starosti ob smrti), polovica umrlih žensk pa mlajša od 81,3 let. Povprečna starost umrlih moških je bila 70,9 let, povprečna starost umrlih žensk pa je bila 79 let.

Preglednica 3. Število umrlih prebivalcev po spolu in povprečne starosti umrlih, regija Koper, 2007

SPOL	ŠT. UMRLIH	MEDIANA STAROSTI ob smrti	POVPREČNA STAROST umrlih
Moški	723	74,7	70,9
Ženske	653	81,3	79,0
SKUPAJ	1.376	78,2	74,7

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*

2.1.2 Število umrlih prebivalcev in starost po upravnih enotah regije Koper

Povprečna starost vseh umrlih prebivalcev regije Koper v letu 2007 je bila 74,7 let. Najvišja povprečna starost umrlih je bila v upravni enoti (UE) Ilirska Bistrica (76,9 let), najnižja pa v UE Izola (72,3 let).

Preglednica 4. Število vseh umrlih prebivalcev in povprečje starosti umrlih, regija Koper po UE, 2007

UPRAVNA ENOTA	ŠT. UMRLIH	MEDIANA STAROSTI ob smrti	POVPREČNA STAROST umrlih
IL. BISTRICA	163	79,8	76,9
IZOLA	131	75,1	72,3
KOPER	463	78,1	74,4
PIRAN	150	76,4	73,2
POSTOJNA	204	77,8	75,0
SEŽANA	265	79,0	75,8
REGIJA	1.376	78,2	74,7

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

Najvišja povprečna starost umrlih moških je bila v UE Sežana (72,6 let), najnižja pa v UE Izola (68,9 let).

Preglednica 5. Število umrlih moških in povprečje starosti umrlih, regija Koper po UE, 2007

UPRAVNA ENOTA	ŠT. UMRLIH	MEDIANA STAROSTI ob smrti	POVPREČNA STAROST umrlih
IL. BISTRICA	82	74,9	72,0
IZOLA	74	70,6	68,9
KOPER	252	74,8	71,4
PIRAN	76	73,6	69,5
POSTOJNA	103	71,2	69,2
SEŽANA	136	77,5	72,6
REGIJA	723	74,7	70,9

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

Najvišja povprečna starost umrlih žensk je bila v UE Ilirska Bistrica (81,8 let), najnižja pa v UE Izola (76,6 let).

Preglednica 6. Število umrlih žensk in povprečje starosti umrlih, regija Koper po UE, 2007

UPRAVNA ENOTA	ŠT. UMRLIH	MEDIANA STAROSTI ob smrti	POVPREČNA STAROST umrlih
IL. BISTRICA	81	84,0	81,8
IZOLA	57	77,4	76,6
KOPER	211	81,0	78,1
PIRAN	74	78,8	77,1
POSTOJNA	101	83,4	80,8
SEŽANA	129	80,8	79,2
REGIJA	653	81,3	79,0

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

2.2 VZROKI SMRTI

Vzroki smrti so šifrirani po 10. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). V analizi so podatki o vzrokih smrti prikazani po poglavjih MKB-10 od I. do XIX..

2.2.1 Število umrlih prebivalcev regije Koper po vzrokih smrti

Preglednica 7. Število umrlih prebivalcev po najpogostejših vzrokih smrti in spolu, regija Koper, 2007

Skupina bolezni po MKB-10	Moški	Ženske	Vsi
II. Neoplazme	244	201	445
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	15	15	30
IX. Bolezni obtočil	248	296	544
X. Bolezni dihal	59	43	102
XI. Bolezni prebavil	43	28	71
XIV. Bolezni sečil in spolovil	9	9	18
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	9	6	15
XIX. Poškodbe in zastrupitve	68	40	108
Ostale skupine	28	15	43
SKUPAJ	723	653	1.376

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

Preglednica 8. Število vseh umrlih po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper po UE, 2007

Skupina bolezni po MKB-10	IL. BISTRICA	IZOLA	KOPER	PIRAN	POSTOJNA	SEŽANA	REGIJA KOPER
II. Neoplazme	41	43	171	60	64	66	445
IX. Bolezni obtočil	65	43	176	50	90	120	544
X. Bolezni dihal	18	15	31	9	14	15	102
XI. Bolezni prebavil	10	6	22	6	6	21	71
XIX. Poškodbe in zastrupitve	12	13	30	15	13	25	108
Ostale skupine	17	11	33	20	17	18	106
SKUPAJ	163	131	463	150	204	265	1.376

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

2.2.2 Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) po vzrokih smrti

Za medsebojno primerjanje umrljivosti v različnih regijah ali državah uporabljamo starostno standardizirano stopnjo umrljivosti (SDR - Standardized Death Rate). Na ta način odpravimo vpliv starostne strukture prebivalstva na podatke o umrljivosti. V analizi smo za standardizacijo uporabili podatke o starostni strukturi evropske populacije.

SDR na 100.000 prebivalcev se izračuna po formuli:

$$SDR = \sum_{i=0}^N \left(\frac{\text{št. primerov}}{\text{št. prebivalcev}} 100.000 \right) * ESP$$

ESP = stara Evropska standardna populacija

N = zgornji razred starostne meje umrlih, ki je določena na 85 let in več

i = starost ob smrti

Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) zaradi vseh vzrokov smrti je bila v letu 2007 v regiji Koper 649 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, kar je za 19 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev manj v primerjavi s slovenskim povprečjem. V primerjavi z letom 2006 se je SDR v regiji Koper povečala za 13 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.


Glavni vzrok smrti so bile, tako v regiji Koper, kot v Sloveniji, bolezni obtočil, na drugem mestu pa so bile neoplazme (rakava obolenja). SDR zaradi bolezni obtočil je bila 242 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev regije Koper, kar je bilo za 17 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev manj od slovenskega povprečja. Zaradi rakavih obolenj je bilo 214 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, kar je bilo za 9 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev nad slovenskim povprečjem. Tretji najpogostejši vzroki smrti prebivalcev regije Koper so bile poškodbe in zastrupitve (65 pričakovanih smrti / 100.000 prebivalcev), sledile so bolezni dihal (40 pričakovanih smrti / 100.000 prebivalcev) in bolezni prebavil (33 pričakovanih smrti / 100.000 prebivalcev).

Preglednica 9. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) / 100.000 prebivalcev po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007

Skupina bolezni po MKB-10	Regija Koper	Slovenija
II. Neoplazme	214,03	205,75
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	12,94	10,13
V. Duševne in vedenjske motnje	6,29	4,98
IX. Bolezni obtočil	242,62	259,53
X. Bolezni dihal	40,96	35,42
XI. Bolezni prebavil	33,66	45,77
XIV. Bolezni sečil in spolovil	7,29	10,46
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	7,46	9,57
XIX. Poškodbe in zastrupitve	65,00	61,96
Vsi vzroki	649,02	668,71

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Slika 3. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) / 100.000 prebivalcev po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS


SDR zaradi vseh vzrokov smrti pri moških je bila v letu 2007 v regiji Koper 902 pričakovanih smrti na 100.000 moških, kar je bilo le za 3 pričakovane smrti na 100.000 moških manj v primerjavi s Slovenijo. V letu 2006 je ta razlika znašala 39 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev. Najpogostejši vzroki smrti pri moških so bile v regiji Koper v letu 2007 bolezni obtočil (316 pričakovanih smrti / 100.000 moških), neoplazme (299 pričakovanih smrti / 100.000 moških), poškodbe in zastrupitve (88 pričakovanih smrti / 100.000 moških), bolezni dihal (70 pričakovanih smrti / 100.000 moških), ter bolezni prebavil (52 pričakovanih smrti / 100.000 moških).

Preglednica 10. *SDR / 100.000 moških po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Regija Koper	Slovenija
I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	4,85	7,11
II. Neoplazme	299,88	293,37
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	16,76	10,91
V. Duševne in vedenjske motnje	11,92	8,85
VI. Bolezni živčevja	4,34	11,39
IX. Bolezni obtočil	316,08	322,18
X. Bolezni dihal	70,68	56,70
XI. Bolezni prebavil	52,06	63,70
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	4,90	2,18
XIV. Bolezni sečil in spolovil	10,81	13,41
XVII. Prirojene napake	8,46	2,62
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	11,67	14,42
IXX. Poškodbe in zastrupitve	88,36	94,11
Vsi vzroki	902,69	905,76

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Slika 4. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) / 100.000 moških po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

SDR zaradi vseh vzrokov smrti pri ženskah je bila v letu 2007 v regiji Koper 465 pričakovanih smrti na 100.000 žensk, kar je 28 pričakovanih smrti na 100.000 žensk manj v primerjavi s povprečjem za ženske v Sloveniji. V letu 2006 je ta razlika znašala 44 pričakovanih smrti na 100.000 žensk. Najpogostejši vzroki smrti žensk regije Koper v letu 2007 so bile bolezni obtočil (187 pričakovanih smrti / 100.000 žensk), neoplazme (154 pričakovanih smrti / 100.000 žensk), poškodbe in zastrupitve (41 pričakovanih smrti / 100.000 žensk), bolezni dihal (26 pričakovanih smrti / 100.000 žensk) ter bolezni prebavil (19 pričakovanih smrti / 100.000 žensk).


V primerjavi z letom 2006 opazamo, da se je povečala stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov za 17 pričakovanih smrti na 100.000 žensk. Med glavnimi vzroki smrti smo v letu 2007 ugotovili porast stopnje umrljivosti zaradi poškodb in zastrupitev ter rakavih obolenj, padec stopnje umrljivosti pa zaradi bolezni obtočil.

Preglednica 11. SDR / 100.000 žensk po vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007

Skupina bolezni po MKB-10	Regija Koper	Slovenija
II. Neoplazme	154,60	148,02
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	9,53	9,26
IX. Bolezni obtočil	187,98	210,82
X. Bolezni dihal	26,87	24,04
XI. Bolezni prebavil	19,41	29,87
XIV. Bolezni sečil in spolovil	5,67	9,17
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	4,91	5,47
XIX. Poškodbe in zastrupitve	41,01	32,25
Vsi vzroki	465,09	493,66

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Slika 5. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) / 100.000 žensk po najpogostejših vzrokih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

2.2.2.1 SDR za nekatere specifične vzroke smrti

Smrti zaradi zunanjih vzrokov

Smrti zaradi zunanjih vzrokov so opredeljene v poglavju XX. MKB-10 in sicer po naslednjih sklopih: nezgode, namerne samopoškodbe (samomori), napadi, dogodki nedoločenega namena, zakonito posredovanje in vojne operacije, zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo, kasne posledice zunanjih vzrokov in dodatni dejavniki uvrščeni drugje.

SDR zaradi transportnih nezgod je bila v letu 2007 v regiji Koper 18 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, kar je 4 pričakovane smrti na 100.000 prebivalcev več v primerjavi s slovenskim povprečjem. SDR zaradi samomorov je v regiji Koper znašala 13 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev oziroma 5 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev manj v primerjavi s slovenskim povprečjem.

V primerjavi z letom 2006 ugotavljamo, da se je stopnja umrljivosti zaradi transportnih nezgod povečala za 2 pričakovani smrti na 100.000 prebivalcev. Velika razlika med spoloma se je pokazala, tako kot v prejšnjih letih, tudi v letu 2007. Stopnja umrljivosti zaradi transportnih nezgod je bila pri moških za 27 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja kot pri ženskah.

Prav tako že vrsto let ugotavljamo razliko med spoloma glede stopnje umrljivosti zaradi samomorov. V letu 2007 je bila stopnja umrljivosti zaradi samomorov pri moških za 15 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja kot pri ženskah.

Preglednica 12. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi najpogostejših zunanjih vzrokov, regija Koper in Slovenija, 2007

Zunanji vzroki umrljivosti	Regija Koper	Slovenija
Transportne nezgode	18,08	14,76
Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb	26,90	25,58
Samomori	13,88	18,40
Dogodek nedoločenega namena	5,95	3,73

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 13. SDR / 100.000 moških zaradi najpogostejših zunanjih vzrokov, regija Koper in Slovenija, 2007

Zunanji vzroki umrljivosti	Regija Koper	Slovenija
Transportne nezgode	31,55	24,16
Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb	34,81	36,46
Samomori	21,24	30,11
Dogodek nedoločenega namena	4,83	5,75

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 14. SDR / 100.000 žensk zaradi najpogostejših zunanjih vzrokov, regija Koper in Slovenija, 2007

Zunanji vzroki umrljivosti	Regija Koper	Slovenija
Transportne nezgode	3,04	5,61
Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb	20,48	15,99
Samomori	6,70	7,88
Dogodek nedoločenega namena	6,93	1,68

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Ishemične bolezni srca

SDR zaradi ishemičnih bolezni srca je že vrsto let pod slovenskim povprečjem. V letu 2007 je znašala v regiji Koper 58 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 67 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev. Tudi pri tem vzroku smrti opazamo veliko razliko med spoloma. Pri moških regije Koper je bila stopnja umrljivosti zaradi ishemične bolezni srca za 58 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja v primerjavi z ženskami.

Preglednica 15. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi ishemičnih bolezni srca, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	91,86	97,60
Ženske	33,76	43,81
Skupaj	58,61	67,23

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Cerebrovaskularne bolezni

SDR zaradi cerebrovaskularnih bolezni je bila v regiji Koper v letu 2007 40 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa za 16 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja (56 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev). Razlika med spoloma je v regiji Koper znašala le 1 pričakovano smrt na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa je bila razlika večja in sicer pri moških je bilo 19 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev več v primerjavi z ženskami.

Preglednica 16. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi cerebrovaskularni bolezni, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	39,79	66,96
Ženske	38,74	48,87
Skupaj	40,58	56,61

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Pljučni rak

V letu 2007 je bila SDR zaradi pljučnega raka v regiji Koper 36 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, kar je 6 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev manj v primerjavi s slovenskim povprečjem. Tudi pri pljučnem raku ugotavljamo veliko razliko med spoloma, tako v regiji Koper, kot v Sloveniji. V regiji Koper je bila stopnja umrljivosti zaradi pljučnega raka pri moških za 47 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja v primerjavi z ženskami, v Sloveniji je ta razlika znašala 54 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.

Preglednica 17. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi pljučnega raka, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	62,87	73,48
Ženske	15,37	19,14
Skupaj	36,12	42,56

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Rak dojke

Rak dojke je vodilni rak pri ženskah zahodne civilizacij. SDR zaradi raka dojke je bila v regiji Koper 30 pričakovanih smrti na 100.000 žensk, kar je 5 pričakovanih smrti na 100.000 žensk več v primerjavi s povprečjem za ženske v Sloveniji. Uvajanje programa DORA in njegova izvedba po celotni Sloveniji ima za cilje odkrivanje zgodnjega stadija raka dojke pri ženskah, podaljšanje preživetja in zmanjšanje umrljivosti zaradi tega vzroka.

Preglednica 18. *SDR / 100.000 prebivalcev zaradi raka dojke, regija Koper in Slovenija, 2007*

	Regija Koper	Slovenija
Moški	-	-
Ženske	30,20	25,00
Skupaj	17,72	14,69

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Rak materničnega vratu

SDR zaradi raka materničnega vratu je bila v regiji Koper pod slovenskim povprečjem. V zadnjih letih se je stopnja umrljivosti zaradi raka materničnega vratu občutno zmanjšala. Na ugodne ugotovitve je vsekakor vplival preventivni program ZORA s ciljem zgodnjega odkrivanja predrakavih obolenj materničnega vratu.

Rak ustne votline in žrela

V letu 2007 je bila SDR zaradi raka ustne votline in žrela v regiji Koper 8 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 6 pričakovanih smrt na 100.000 prebivalcev. V regiji Koper je bila v letu 2007 SDR zaradi tega raka za 15 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja pri moških v primerjavi z ženskami, v Sloveniji je ta razlika znašala 10 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.

Preglednica 19. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi raka ustne votline in žrela, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	16,58	11,72
Ženske	1,61	1,66
Skupaj	7,75	6,15

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Sladkorna bolezen

V regiji Koper je bila SDR zaradi sladkorne bolezni 12 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, kar je za 3 pričakovane smrti na 100.000 prebivalcev več v primerjavi s slovenskim povprečjem. Tudi pri sladkorni bolezni ugotavljamo, da je bila SDR zaradi sladkorne bolezni višja pri moških v primerjavi z ženskami. V letu 2007 je ta razlika v regiji Koper znašala 8 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.

Preglednica 20. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi sladkorne bolezni, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	16,76	10,40
Ženske	8,93	7,86
Skupaj	12,56	9,10

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Kronične bolezni jeter in ciroza

SDR zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze je v regiji Koper znašala 15 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 27 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.

V regiji Koper je bila v letu 2007 SDR zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze za 24 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev višja pri moških kot pri ženskah. V Sloveniji je ta razlika znašala 27 pričakovanih smrti na 100.000 prebivalcev.

Preglednica 21. SDR / 100.000 prebivalcev zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze, regija Koper in Slovenija, 2007

	Regija Koper	Slovenija
Moški	28,26	41,44
Ženske	4,77	14,26
Skupaj	15,83	27,10

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

2.2.3 Vzroki umrljivosti po starostnih skupinah

Vzrok smrti malih, predšolskih in šolskih otrok starih 0 - 14 let v regiji Koper so bile prirojene napake ter poškodbe in zastrupitve.

Mladostniki stari 15 - 19 let so najpogosteje umirali zaradi poškodb in zastrupitev.

Glavni vzroki smrti odraslih prebivalcev regije Koper starih 20 - 64 let so bili: neoplazme (rakava obolenja), poškodbe in zastrupitve ter bolezni obtočil.

Starejši odrasli prebivalci v starosti 65 let in več so najpogosteje umirali zaradi bolezni obtočil in neoplazm.

Preglednica 22. Stopnja umrljivosti / 1.000 prebivalcev po najpogostejših vzrokih smrti in starostnih skupinah, regija Koper, 2007

Starostna skupina	Skupina bolezni po MKB-10	MOŠKI	ŽENSKE	VSI
0 - 14 let	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,00	0,12	0,06
	IX. Bolezni obtočil	0,11	0,00	0,06
	XVII. Prirojene napake	0,34	0,12	0,23
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	0,11	0,36	0,23
	Vsi vzroki	0,56	0,59	0,58
15 - 19 let	IXX. Poškodbe in zastrupitve	1,05	0,00	0,54
	Vsi vzroki	1,05	0,00	0,54
20 - 64 let	II. Neoplazme	1,59	0,89	1,25
	V. Duševne in vedenjske motnje	0,19	0,00	0,10
	IX. Bolezni obtočil	0,80	0,11	0,47
	XI. Bolezni prebavil	0,19	0,00	0,10
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	0,99	0,27	0,64
	Vsi vzroki	3,98	1,34	2,71
65 let in več	I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	0,42	0,14	0,25
	II. Neoplazme	17,36	10,93	13,47
	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,10	0,14	0,12
	IV. Endokrine, prehranske in presnovne b.	1,56	1,02	1,23
	V. Duševne in vedenjske motnje	0,10	0,07	0,08
	VI. Bolezni živčevja	0,42	0,20	0,29
	IX. Bolezni obtočil	21,63	19,75	20,49
	X. Bolezni dihal	5,72	2,85	3,98
	XI. Bolezni prebavil	3,54	1,90	2,55
	XII. Bolezni kože in podkožja	0,10	0,14	0,12
	XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	0,10	0,14	0,12
	XIV. Bolezni sečil in spolovil	0,94	0,61	0,74
	XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,62	0,34	0,45
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	1,56	1,70	1,64
	Vsi vzroki	54,17	39,91	45,54

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 23. Stopnja umrljivosti / 1.000 prebivalcev po vzrokih smrti in starostnih skupinah, Slovenija, 2007

Starostna skupina	Skupina bolezni po MKB-10	MOŠKI	ŽENSKES	VSI
0 - 14 let	II. Neoplazme	0,03	0,04	0,04
	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,01	0,01	0,01
	IV. Endokrine, prehranske in presnovne b.	0,00	0,01	0,00
	VI. Bolezni živčevja	0,02	0,02	0,02
	IX. Bolezni obtočil	0,01	0,00	0,00
	X. Bolezni dihal	0,01	0,00	0,01
	XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	0,01	0,00	0,00
	XVI. Stanja v perinatalnem obdobju	0,09	0,07	0,08
	XVII. Prirojene napake	0,08	0,13	0,11
	XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,01	0,01	0,01
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	0,04	0,09	0,06
	Skupaj	0,32	0,37	0,35
15 - 19 let	II. Neoplazme	0,07	0,05	0,06
	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,00	0,02	0,01
	VI. Bolezni živčevja	0,02	0,04	0,03
	IX. Bolezni obtočil	0,03	0,00	0,02
	X. Bolezni dihal	0,00	0,02	0,01
	XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,02	0,00	0,01
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	0,43	0,18	0,31
Skupaj	0,56	0,30	0,44	
20 - 64 let	I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	0,03	0,01	0,02
	II. Neoplazme	1,55	0,97	1,27
	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,01	0,00	0,00
	IV. Endokrine, prehranske in presnovne b.	0,03	0,03	0,03
	V. Duševne in vedenjske motnje	0,10	0,01	0,05
	VI. Bolezni živčevja	0,07	0,06	0,06
	IX. Bolezni obtočil	0,98	0,26	0,63
	X. Bolezni dihal	0,10	0,03	0,06
	XI. Bolezni prebavil	0,55	0,21	0,38
	XII. Bolezni kože in podkožja	0,00	0,00	0,00
	XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	0,01	0,01	0,01
	XIV. Bolezni sečil in spolovil	0,02	0,01	0,02
	XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	0,00	0,00	0,00
	XVII. Prirojene napake	0,01	0,01	0,01
	XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,14	0,05	0,09
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	0,97	0,20	0,59
Skupaj	4,58	1,87	3,26	
65 let in več	I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	0,42	0,41	0,41
	II. Neoplazme	17,18	9,13	12,25
	III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,09	0,11	0,10
	IV. Endokrine, prehranske in presnovne b.	0,77	0,77	0,77

Starostna skupina	Skupina bolezni po MKB-10	MOŠKI	ŽENSKE	VSI
65 let in več	V. Duševne in vedenjske motnje	0,27	0,09	0,16
	VI. Bolezni živčevja	0,58	0,37	0,45
	IX. Bolezni obtočil	20,53	21,27	20,98
	X. Bolezni dihal	3,98	2,41	3,02
	XI. Bolezni prebavil	2,66	1,85	2,16
	XII. Bolezni kože in podkožja	0,10	0,11	0,11
	XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	0,11	0,15	0,13
	XIV. Bolezni sečil in spolovil	0,86	0,94	0,91
	XVII. Prirojene napake	0,01	0,01	0,01
	XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,50	0,26	0,35
	IXX. Poškodbe in zastrupitve	2,64	1,75	2,10
	Skupaj		50,69	39,63

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

3 PREZGODNJA UMRLJIVOST V REGIJI KOPER v letu 2007

Prezgodnja umrljivost je opredeljena kot smrt oseb, ki umrejo v starosti pred dogovorno mejo 65 let. V poglavju o prezgodnji umrljivosti so prikazani podatki o številu prezgodnjih smrti in številu prezgodaj izgubljenih let potencialnega življenja (YPLL - Years of Potential Life Lost). Izračun YPLL temelji na številu prezgodnjih smrti. Prezgodnja umrljivost in stopnje YPLL so izračunane na 100.000 prebivalcev.

Zmanjševanje prezgodnjih, potencialno preprečljivih smrti je med prednostnimi cilji javnega zdravja. Kot potencialno preprečljive bolezni in stanja opredeljujemo tiste bolezni in stanja, pri katerih je možno vplivati na pojav v populaciji, ali pa obstajajo relativno uspešni načini zdravljenja. V skupino vzrokov prezgodnjih smrti, pri katerih lahko zmanjšamo pojav v populaciji z ustreznimi preventivnimi ukrepi, uvrščamo: rak dihalnih poti in pljuč, kožni rak, ishemično bolezen srca, jetrno ciroza, prometne nezgode in druge, povezane s preprečljivimi dejavniki tveganja (zloraba alkohola in tobaka, telesna neaktivnost, debelost idr.). V skupino vzrokov, pri katerih obstajajo relativno uspešni načini zdravljenja, pa sodijo tuberkuloza, rak dojke, rak maternice, rak mod, kronična revmatična bolezen srca, levkemije, prirojene srčno-žilne bolezni idr.

Število YPLL je zmnožek števila umrlih razporejenih po petletnih starostnih skupinah in števila let, ki bi jih oseba še živela, če ne bi umrla prezgodaj. Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja so izračunana po formuli:

$$YPLL = \sum_{i=0}^N d_i(N - i)$$

d_i = število umrlih pri starosti (*i*) let

N = zgornja starostna meja prezgodnje smrti

i = starost ob smrti

Stopnja YPLL se prikazuje na 100.000 prebivalcev in se izračuna po formuli:

$$\frac{\sum (64,99 - \text{starost ob smrti}) \times \text{število smrti pri vsaki starosti}}{\text{število prebivalcev, mlajših od 65 let}} \times 100.000$$

3.1 ŠTEVILO PREZGODNIJH SMRTI

3.1.1 Število prezgodnjih smrti po spolu

Leta 2007 je v regiji Koper umrlo pred starostjo 65 let 267 oseb (202 moška in 65 žensk). Delež prezgodnjih smrti je znašal 19,4 % vseh primerov smrti v regiji Koper in 23,6 % v Sloveniji.

Preglednica 24. Število umrlih prebivalcev do 64. leta starosti po spolu in povprečje starosti umrlih, regija Koper, 2007

SPOL	ŠT. UMRЛИH	MEDIANA STAROSTI ob smrti	POVPREČNA STAROST umrlih
Moški	202	55,1	50,2
Ženske	65	55,3	50,2
SKUPAJ	267	55,2	50,2

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

3.2 VZROKI PREZGODNJE UMRLJIVOSTI

3.2.1 Število prezgodnjih smrti po vzrokih

Prezgodnje smrti so predstavljale pri moških 28 %, pri ženskah pa 10 % vseh primerov smrti v regiji Koper. Največji delež od vseh prezgodnjih smrti je bil zaradi rakavih obolenj (43,8 %), na drugem mestu so bile poškodbe in zastrupitve (25,5 %) ter na tretjem bolezni obtočil (16,9 %).

Preglednica 25 a. Število in delež prezgodnjih smrti zaradi najpogostejših vzrokov iz poglavij MKB-10 po spolu, regija Koper, 2007

Skupina bolezni po MKB-10	Moški	Ženske	Vsi	%*	%**
II. Neoplazme	77	40	117	26,3	43,8
V. Duševne in vedenjske motnje	9	0	9	81,8	3,4
IX. Bolezni obtočil	40	5	45	8,3	16,9
XI. Bolezni prebavil	9	0	9	12,7	3,4
XIX. Poškodbe in zastrupitve	53	15	68	63,0	25,5
Vsi vzroki	202	65	267	19,4	100,0

%* delež od vseh smrti iz posameznega poglavja

%** delež od vseh prezgodnjih smrti

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

Preglednica 25 b. Število prezgodnjih smrti zaradi najpogostejših vzrokov iz poglavij MKB-10 po spolu, Slovenija, 2007


Skupina bolezni po MKB-10	Moški	Ženske	Vsi	%*	%**
I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	22	10	32	19,3	0,7
II. Neoplazme	1.042	619	1.661	29,5	37,9
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	23	22	45	15,4	1,0
V. Duševne in vedenjske motnje	64	6	70	57,4	1,6
VI. Bolezni živčevja	51	42	93	38,9	2,1
IX. Bolezni obtočil	658	166	824	10,8	18,8
X. Bolezni dihal	68	17	85	8,0	1,9
XI. Bolezni prebavil	365	132	497	41,5	11,4
XIII. B. mišičnoskeletnega sistema	10	9	19	30,6	0,4
XIV. Bolezni sečil in spolovil	16	7	23	7,3	0,5
XVI. Stanja v perinatalnem obdobju	13	9	22	100,0	0,5
XVII. Prirojene napake	19	26	45	93,8	1,0
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	93	31	124	52,3	2,8
XIX. Poškodbe in zastrupitve	675	149	824	54,9	18,8
Vsi vzroki	3.125	1.252	4.377	23,6	100,0

*% delež od vseh smrti iz posameznega poglavja

**% delež od vseh prezgodnjih smrti

Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

Slika 6. Delež (%) prezgodnjih smrti po najpomembnejših vzrokih od vseh prezgodnjih smrti, regija Koper in Slovenija, 2007



Vir podatkov: Zbirka umrlih 2007, IVZ RS

3.2.2 Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL

Izgubljena leta potencialnega življenja so ustrezen kazalnik problema in bremena prezgodnje umrljivosti.

Stopnja izgubljenih let potencialnega življenja na 100.000 prebivalcev (YPLL) je bila v letu 2007 v regiji Koper nižja v primerjavi s slovenskim povprečjem. Velika razlika v YPLL se je pokazala med spoloma, saj je pri moških regije Koper v letu 2007 presegala za 210 % vrednosti pri ženskah.

Najvišja YPLL je bila zaradi poškodb in zastrupitev, na drugem mestu so bile neoplazme in na tretjem mestu bolezni obtočil.

Preglednica 26 a. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po najpogostejših vzrokih po poglavjih MKB-10 in po spolu, regija Koper, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	732,5	1.033,7	350,0	489,8	1.082,5	760,6
III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,0	0,0	57,5	80,5	57,5	40,4
V. Duševne in vedenjske motnje	87,5	123,5	0,0	0,0	87,5	61,5
IX. Bolezni obtočil	415,5	586,4	52,5	73,5	468,0	328,8
XI. Bolezni prebavil	92,5	130,5	0,0	0,0	92,5	65,0
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	32,5	45,9	7,5	10,5	40,0	28,1
XVII. Prirojene napake	224,0	316,1	64,5	90,3	288,5	202,7
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	27,5	38,8	17,5	24,5	45,0	31,6
XIX. Poškodbe in zastrupitve	1.358,0	1.916,4	428,0	598,9	1.786,0	1.254,9
Vsi vzroki	3.015,0	4.254,7	980,0	1.371,4	3.995,0	2.807,0

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS


Preglednica 26 b. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po najpogostejših vzrokih po poglavjih MKB-10 in po spolu, Slovenija, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	290,0	29,1	175,0	17,1	465,0	23,0
II. Neoplazme	10.081,5	1.013,1	6.529,0	637,4	16.610,5	822,5
III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	109,5	11,0	117,5	11,5	227,0	11,2
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	207,5	20,9	275,5	26,9	483,0	23,9
V. Duševne in vedenjske motnje	780,0	78,4	110,0	10,7	890,0	44,1
VI. Bolezni živčevja	1.003,0	100,8	777,0	75,9	1.780,0	88,1
IX. Bolezni obtočil	6.635,5	666,8	1.545,0	150,8	8.180,5	405,1
X. Bolezni dihal	834,0	83,8	167,5	16,4	1.001,5	49,6
XI. Bolezni prebavil	4.072,5	409,2	1.480,0	144,5	5.552,5	275,0
Xii. Bolezni kože	7,5	0,8	7,5	0,7	15,0	0,7
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	135,5	13,6	97,5	9,5	233,0	11,5
XIV. Bolezni sečil in spolovil	115,0	11,6	32,5	3,2	147,5	7,3
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	0,0	0,0	122,5	12,0	122,5	6,1
XVI. Stanja v perinatalnem obdobju	831,5	83,6	580,5	56,7	1.412,0	69,9
XVII. Prirojene napake	983,0	98,8	1.252,0	122,2	2.235,0	110,7
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	1.306,5	131,3	484,5	47,3	1.791,0	88,7
XIX. Poškodbe in zastrupitve	15.724,0	1.580,1	3.641,5	355,5	19.365,5	959,0
SKUPAJ	43.116,5	4.332,8	17.395,0	1.698,3	60.511,5	2.996,5

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS, Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*

Slika 7. *Stopnja YPLL / 100.000 prebivalcev po spolu, regija Koper in Slovenija, 2007*



Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*

Podatke YPLL smo prikazali tudi po posameznih upravnih enotah (UE) regije Koper. Pri interpretaciji teh podatkov je potrebno upoštevati majhno število primerov v posamezni UE, ki nam zelo zmanjšuje zanesljivost in tako omejuje uporabnost za primerjave med posameznimi UE.

Preglednica 27. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po poglavjih MKB-10 po spolu, UE Ilirska Bistrica, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	32,5	464,6	52,5	733,9	85,0	600,7
V. Duševne in vedenjske motnje	10,0	142,9	0,0	0,0	10,0	70,7
IX. Bolezni obtočil	20,0	285,9	0,0	0,0	20,0	141,3
XI. Bolezni prebavil	22,5	321,6	0,0	0,0	22,5	159,0
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	22,5	321,6	0,0	0,0	22,5	159,0
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	0,0	0,0	17,5	244,6	17,5	123,7
XIX. Poškodbe in zastrupitve	150,5	2.151,2	0,0	0,0	150,5	1.063,6
Vsi vzroki	258,0	3.687,8	70,0	978,5	328,0	2.318,0

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 28. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po najpogostejših vzrokih in po spolu, UE Izola, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	95,0	1.218,7	15,0	194,1	110,0	708,6
V. Duševne in vedenjske motnje	20,0	256,6	0,0	0,0	20,0	128,8
IX. Bolezni obtočil	32,5	416,9	7,5	97,0	40,0	257,7
XI. Bolezni prebavil	20,0	256,6	0,0	0,0	20,0	128,8
XVII. Prirojene napake	37,5	481,1	0,0	0,0	37,5	241,6
XIX. Poškodbe in zastrupitve	180,0	2.309,2	80,0	1.035,1	260,0	1.674,8
Vsi vzroki	385,0	4.939,1	105,0	1.358,5	490,0	3.156,4

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 29. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po najpogostejših vzrokih in po spolu, UE Koper, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	277,5	1.119,3	150,0	591,6	427,5	852,5
III. Bolezni krvi in krvotvornih organov	0,0	0,0	57,5	226,8	57,5	114,7
V. Duševne in vedenjske motnje	27,5	110,9	0,0	0,0	27,5	54,8
IX. Bolezni obtočil	162,5	655,5	30,0	118,3	192,5	383,9
X. Bolezni dihal	15,0	60,5	0,0	0,0	15,0	29,9
XVII. Prirojene napake	129,0	520,3	0,0	0,0	129,0	257,3
IXX. Poškodbe in zastrupitve	372,5	1.502,5	170,5	672,5	543,0	1.082,9
Vsi vzroki	989,0	3.989,2	408,0	1.609,3	1.397,0	2.785,9

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
*Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS*Preglednica 30. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po najpogostejših vzrokih in po spolu, UE Piran, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	82,5	972,6	47,5	534,1	130,0	748,2
XI. Bolezni prebavil	22,5	265,3	0,0	0,0	22,5	129,5
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	0,0	0,0	7,5	84,3	7,5	43,2
XVII. Prirojene napake	57,5	677,9	0,0	0,0	57,5	330,9
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	7,5	88,4	0,0	0,0	7,5	43,2
XIX. Poškodbe in zastrupitve	192,5	2.269,5	37,5	421,7	230,0	1.323,7
Vsi vzroki	367,5	4.332,7	92,5	1.040,1	460,0	2.647,5

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 31. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po poglavjih MKB-10 po spolu, UE Postojna, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	120,0	1.135,5	20,0	189,7	140,0	663,2
V. Duševne in vedenjske motnje	12,5	118,3	0,0	0,0	12,5	59,2
IX. Bolezni obtočil	125,5	1.187,5	0,0	0,0	125,5	594,5
X. Bolezni dihal	30,0	283,9	0,0	0,0	30,0	142,1
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema	7,5	71,0	0,0	0,0	7,5	35,5
XVII. Prirojene napake	0,0	0,0	64,5	611,8	64,5	305,5
IXX. Poškodbe in zastrupitve	200,0	1.892,5	55	521,7	255	1.208,0
Vsi vzroki	495,5	4.688,7	139,5	1.323,3	635,0	3.008,1

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS

Preglednica 32. *Prezgodaj izgubljena leta potencialnega življenja - YPLL po poglavjih MKB-10 po spolu, UE Sežana, 2007*

Skupina bolezni po MKB-10	Moški		Ženske		Skupaj	
	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*	Število	Stopnja*
II. Neoplazme	125,0	1.022,2	65,0	551,4	190,0	791,1
V. Duševne in vedenjske motnje	17,5	143,1	0,0	0,0	17,5	72,9
IX. Bolezni obtočil	70,0	572,4	15,0	127,2	85,0	353,9
XI. Bolezni prebavil	27,5	224,9	0,0	0,0	27,5	114,5
XVIII. Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	17,5	143,1	0,0	0,0	17,5	72,9
IXX. Poškodbe in zastrupitve	262,5	2.146,5	85,0	721,0	347,5	1.446,8
SKUPAJ	520,0	4.252,2	165,0	1.399,6	685,0	2.852,0

Stopnja* na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: *Zbirka umrlih 2007, IVZ RS*
Prebivalci po ZR 2007, IVZ RS